جراحة البروستاتا

جراحة البروستاتا

أسباب جراحة البروستاتا

أنواع جراحة البروستاتا

مخاطر جراحة البروستاتا

التعافي بعد جراحة البروستاتا

الملخص

جراحة البروستاتا

هي إجراء يتضمن إزالة جزء من غدة البروستاتا أو كلها. غدة البروستاتا هي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز تقع أسفل المثانة عند الرجال. ينتج السائل الذي يختلط مع الحيوانات المنوية لصنع السائل المنوي. هناك أنواع مختلفة من جراحة البروستاتا ، بما في ذلك الجراحة المفتوحة والجراحة بالمنظار والجراحة بمساعدة الروبوت. ستقدم هذه المقالة لمحة عامة عن جراحة البروستاتا وأنواعها وأسبابها ومخاطرها.

أسباب جراحة البروستاتا:

يوصى عادةً بإجراء جراحة البروستاتا للرجال المصابين بسرطان البروستاتا أو تضخم البروستاتا أو مشاكل المسالك البولية. يعد سرطان البروستاتا السبب الأكثر شيوعًا لإجراء جراحة البروستاتا. قد يوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة غدة البروستاتا إذا تم الكشف عن السرطان وحصره في غدة البروستاتا. يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا ، المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا الحميد (BPH) ، مشاكل في المسالك البولية ، مثل صعوبة التبول أو الحاجة المتكررة للتبول. في بعض الحالات ، قد يُوصى بإجراء عملية جراحية لإزالة جزء من غدة البروستاتا أو كلها للتخفيف من هذه الأعراض.

أنواع جراحة البروستاتا:

هناك عدة أنواع من جراحة البروستاتا ، بما في ذلك:

- الجراحة المفتوحة: يتضمن هذا النوع من الجراحة إجراء شق في أسفل البطن للوصول إلى غدة البروستاتا. يقوم الجراح بعد ذلك بإزالة جزء من غدة البروستاتا أو كلها من خلال الشق.

- جراحة المناظير: يتضمن هذا النوع من الجراحة إجراء شقوق صغيرة في أسفل البطن وإدخال منظار البطن وكاميرا صغيرة وأدوات جراحية لإزالة جزء من غدة البروستاتا أو كلها.

- الجراحة بمساعدة الروبوت: يشبه هذا النوع من الجراحة الجراحة بالمنظار ، لكن الجراح يستخدم ذراعًا آلية للتحكم في الأدوات الجراحية.

مخاطر جراحة البروستاتا:

مثل أي إجراء جراحي ، تنطوي جراحة البروستاتا على بعض المخاطر. يمكن أن تشمل هذه المخاطر:

- العدوى: العدوى خطر مع أي عملية جراحية. عادةً ما يتم إعطاء المضادات الحيوية قبل الجراحة وبعدها لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

- النزيف: يمكن أن تتسبب جراحة البروستاتا في حدوث نزيف حاد. في حالة حدوث نزيف مفرط ، قد يكون من الضروري نقل الدم.

- سلس البول: بعد جراحة البروستاتا ، قد يعاني بعض الرجال من سلس بول مؤقت أو دائم ، وهو عدم القدرة على التحكم في تدفق البول.

- ضعف الانتصاب: يمكن أن تسبب جراحة البروستاتا ضعف الانتصاب ، وهو عدم القدرة على تحقيق أو الحفاظ على الانتصاب الكافي للجماع الجنسي.

- الأضرار التي تلحق بالأعضاء المحيطة: أثناء الجراحة ، قد يتسبب الجراح في تلف الأعضاء المحيطة بشكل عرضي ، مثل المثانة أو المستقيم أو مجرى البول.

التعافي بعد جراحة البروستاتا:

يعتمد وقت التعافي بعد جراحة البروستاتا على نوع الجراحة التي يتم إجراؤها والصحة العامة للفرد. تتطلب الجراحة المفتوحة عادةً إقامة أطول في المستشفى ووقت تعافي أطول من الجراحة بالمنظار أو الجراحة بمساعدة الروبوت. بعد الجراحة ، يمكن إدخال قسطرة في المثانة للمساعدة في تصريف البول. عادة ما يتم إزالة القسطرة في غضون أيام قليلة بعد الجراحة. يستطيع معظم الرجال العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون 6-8 أسابيع بعد الجراحة.

الملخص

جراحة البروستاتا هي إجراء شائع يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا وتضخم البروستاتا ومشاكل الجهاز البولي. هناك عدة أنواع من جراحة البروستاتا ، بما في ذلك الجراحة المفتوحة والجراحة بالمنظار والجراحة بمساعدة الروبوت. بينما تنطوي جراحة البروستاتا على بعض المخاطر ، إلا أنها يمكن أن تكون خيارًا علاجيًا فعالًا لبعض الحالات. إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا ، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد ما إذا كانت جراحة البروستاتا مناسبة لك.

اعتماد: مركز الجراحات التخصصية




KAMC
المعرفة