جراحة سرطان الثدي

سرطان الثدي

هو نوع من السرطان يتطور في أنسجة الثدي. إنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم ، والاكتشاف المبكر والعلاج ضروريان في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. الجراحة هي أحد العلاجات الأساسية لسرطان الثدي. هناك أنواع مختلفة من جراحات سرطان الثدي ولكل منها فوائدها ومخاطرها.

النوع الأكثر شيوعًا من جراحة سرطان الثدي هو استئصال الكتلة الورمية أو جراحة المحافظة على الثدي. في هذا الإجراء ، يقوم الجراح بإزالة الورم وجزء صغير من الأنسجة الطبيعية المحيطة به ، مع ترك باقي الثدي سليمًا. عادة ما يوصى بهذه الجراحة لسرطان الثدي في مراحله المبكرة عندما يكون الورم صغيرًا وموضعًا.

ميزة استئصال الكتلة الورمية هي أنه يسمح للمرأة بالاحتفاظ بمعظم أنسجة ثديها والحفاظ على مظهر ثديها. أيضًا ، تتمتع النساء اللواتي يخضعن لاستئصال الكتلة الورمية بمعدلات بقاء مماثلة لتلك التي تخضع لعملية استئصال الثدي ، وهي إزالة الثدي بالكامل.

نوع آخر من جراحة سرطان الثدي هو استئصال الثدي. في هذا الإجراء ، يزيل الجراح الثدي بالكامل ، بما في ذلك أنسجة الثدي والحلمة والهالة. هناك أنواع مختلفة من استئصال الثدي ، مثل استئصال الثدي البسيط ، واستئصال الثدي الجذري المعدل ، واستئصال الثدي الجذري ، اعتمادًا على مدى الجراحة.

قد يوصى باستئصال الثدي للنساء المصابات بأورام كبيرة أو سرطان انتشر في مناطق متعددة من الثدي. قد تختار النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي أيضًا إجراء استئصال الثدي الوقائي ، وهو استئصال الثديين ، حتى لو لم يكن لديهن سرطان.

إعادة بناء الثدي هو خيار للنساء اللواتي يخضعن لعملية استئصال الثدي. هو إجراء جراحي يعيد تكوين شكل وحجم الثدي باستخدام غرسات أو أنسجة من أجزاء أخرى من الجسم ، مثل البطن أو الظهر.

خزعة العقدة الليمفاوية الحارسة هي إجراء يستخدم لتحديد ما إذا كان سرطان الثدي قد انتشر إلى العقد الليمفاوية. خلال هذا الإجراء ، يقوم الجراح بإزالة واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية الحارسة ، وهي العقد الليمفاوية الأولى التي من المحتمل أن ينتشر السرطان إليها إذا انتشر خارج الثدي. إذا كانت العقد الخافرة لا تحتوي على خلايا سرطانية ، فمن غير المرجح أن يكون السرطان قد انتشر خارج الثدي.

إذا تم العثور على خلايا سرطانية في العقد الليمفاوية الحارسة ، فقد يلزم إزالة العقد الليمفاوية الإضافية في إجراء يسمى تشريح العقدة الليمفاوية الإبطية. يزيل هذا الإجراء معظم العقد الليمفاوية تحت الذراع ، وقد يوصى به للنساء المصابات بأورام أكبر أو سرطان انتشر إلى الغدد الليمفاوية.

تُجرى جراحة سرطان الثدي عادةً تحت تأثير التخدير العام ، وقد تتطلب الإقامة في المستشفى لليلة واحدة أو أكثر ، اعتمادًا على نوع الجراحة. يختلف وقت التعافي ، ولكن يمكن لمعظم النساء العودة إلى الأنشطة الطبيعية في غضون أسابيع قليلة.

مثل أي عملية جراحية ، تنطوي جراحة سرطان الثدي على بعض المخاطر ، مثل النزيف والعدوى ومضاعفات التخدير. قد تعاني النساء اللواتي يخضعن لاستئصال الثدي أيضًا من آثار عاطفية ونفسية ، مثل الاكتئاب والقلق ومشاكل صورة الجسد.

الملخص

تعد جراحة سرطان الثدي عنصرًا أساسيًا في علاج سرطان الثدي. هناك أنواع مختلفة من جراحة سرطان الثدي ، ويعتمد نوع الجراحة الموصى بها على عدة عوامل ، مثل مرحلة السرطان ، وحجم الورم ، وتفضيلات المرأة. في حين أن جراحة سرطان الثدي تنطوي على بعض المخاطر ، فهي بشكل عام طريقة آمنة وفعالة لإزالة السرطان من الثدي وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة. قد تحتاج النساء اللواتي يخضعن لجراحة سرطان الثدي إلى علاجات إضافية ، مثل العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو العلاج الهرموني ، لتقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان.




KAMC
المعرفة