شلل الوجه النصفي

هو حالة تؤثر على عضلات الوجه والأعصاب، مسببة شللاً مؤقتًا أو ضعفًا في جانب واحد من الوجه. تمت تسمية الحالة على اسم السير تشارلز بيل، الجراح الاسكتلندي الذي وصفها لأول مرة في عام 1821. في هذه المقالة، سنناقش الأسباب والأعراض وخيارات العلاج لشلل بيل.

الأسباب

لا يُعرف السبب الدقيق لشلل الوجه النصفي ، لكن يُعتقد أنه ناجم عن التهاب العصب الوجهي الذي يتحكم في عضلات الوجه. قد يحدث هذا الالتهاب بسبب عدوى فيروسية ، مثل فيروس الهربس البسيط ، الذي يسبب تقرحات البرد. تشمل الفيروسات الأخرى التي قد تسبب شلل بيل فيروس الأنفلونزا وفيروس إبشتاين بار والفيروس المضخم للخلايا.

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بشلل الوجه النصفي بسبب عوامل خطر معينة ، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو وجود تاريخ عائلي لهذه الحالة. يمكن أن يحدث أيضًا أثناء الحمل ، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

الأعراض

أكثر أعراض شلل بيل شيوعًا هو الضعف المفاجئ أو الشلل في جانب واحد من الوجه. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة الابتسام أو إغلاق إحدى العينين أو رفع الحاجب على الجانب المصاب. قد تشمل الأعراض الأخرى:

- تدلي الفم أو الجفن من جانب واحد
- فقدان التذوق
- زيادة الحساسية للصوت في أذن واحدة
- ألم أو انزعاج حول الفك أو خلف الأذن في الجانب المصاب
- صداع

في بعض الحالات، قد يؤثر شلل الوجه النصفي أيضًا على القنوات الدمعية ، مما يتسبب في جفاف العين أو الدموع المفرطة.

التشخيص

يتم تشخيص شلل الوجه النصفي عادةً بناءً على الأعراض والفحص البدني من قبل الطبيب. يمكن إجراء اختبارات أخرى ، مثل اختبارات الدم أو دراسات التصوير ، لاستبعاد الحالات الأخرى التي قد تسبب أعراضًا مماثلة.

الاعتماد: مركز العلوم العصبية




KAMC
المعرفة