اعتلال العصب السابع

Facial Nerve Paralysis

محتويات المقال:

ما هو اعتلال العصب السابع؟

ما هي أسباب اعتلال العصب السابع؟

ما هي أعراض اعتلال العصب السابع؟

ما هي مضاعفات اعتلال العصب السابع؟

كيف يتم تشخيص اعتلال العصب السابع؟

كيف يمكن الوقاية من اعتلال العصب السابع؟

ما هو علاج اعتلال العصب السابع؟

اعتلال العصب السابع:

يشير اعتلال العصب الوجهي إلى أي حالة تؤثر على العصب الوجهي أو وظيفته. العصب الوجهي مسؤول عن التحكم في عضلات الوجه، بما في ذلك تلك المستخدمة للابتسام وإغلاق العينين. يمكن أن يؤدي تلف أو خلل وظيفي في العصب الوجهي إلى ضعف أو تدلي الوجه من جانب واحد، وصعوبة إغلاق العين في الجانب المصاب، وصعوبة في تكوين تعابير الوجه.

أسباب اعتلال العصب السابع:

يمكن أن ينتج مرض العصب الوجهي عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

- الإصابات: يمكن أن تؤدي إصابة الوجه أو الجمجمة إلى تلف العصب الوجهي.
- العدوى: يمكن أن تسبب بعض أنواع العدوى، مثل الهربس النطاقي (القوباء المنطقية) أو مرض لايم، التهابًا في العصب الوجهي وتؤدي إلى مرض العصب الوجهي.
- الأورام: يمكن للأورام الموجودة بالقرب من العصب الوجهي أن تضغط على العصب وتتلفه.

- الاضطرابات العصبية: يمكن لبعض الاضطرابات العصبية، مثل شلل الوجه النصفي، أن تسبب التهاب العصب الوجهي، مما يؤدي إلى مرض العصب الوجهي.
- اضطرابات المناعة الذاتية: قد يكون سبب مرض العصب الوجهي اضطراب المناعة الذاتية، مثل متلازمة غيلان باريه أو الساركويد.
- وراثية: بعض أمراض العصب الوجهي وراثية مثل شلل الوجه الخلقي.

أعراض اعتلال العصب السابع:

يمكن أن تختلف أعراض مرض العصب الوجهي تبعًا للسبب الأساسي ومدى تلف الأعصاب.

تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

- ضعف أو تدلى الوجه من جانب واحد: قد تظهر عضلات أحد جانبي الوجه متدلية أو متهدله، مما يجعل من الصعب إغلاق العين على هذا الجانب أو الابتسام أو اغلاق الشفتين أثناء مضغ الطعام أو عمل تعابير وجه أخرى.
- فقدان حركة الوجه: قد يكون الجانب المصاب من الوجه غير قادر على الحركة أو تكون حركته محدودة.
- صعوبة إغلاق العين على الجانب المصاب: قد لا تتمكن العين المصابة من الإغلاق التام مما قد يؤدي إلى جفاف وتهيج وزيادة الحساسية للضوء.
- فقدان التذوق: في بعض الحالات، فقدان التذوق في الثلثين الأماميين من اللسان على الجانب المصاب من الوجه.
- ألم الوجه أو عدم الراحة: قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بمرض العصب الوجهي من ألم أو إزعاج في الوجه.
- زيادة الحساسية للصوت: قد يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بمرض العصب الوجهي حساسية متزايدة للصوت، وهو ما يعرف بفرط السمع.

مضاعفات اعتلال العصب السابع:

يمكن أن يؤدي مرض العصب الوجهي إلى عدة مضاعفات، منها:

- جفاف العين المزمن: يمكن أن تؤدي صعوبة إغلاق العين على الجانب المصاب إلى جفاف العين المزمن وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.
- فقدان التذوق: فقدان حاسة التذوق في الجزء الأمامي من ثلثي اللسان على الجانب المصاب من الوجه.
- العزلة الاجتماعية: يمكن أن يسبب مرض العصب الوجهي التشوه ويمكن أن يجعل من الصعب على الناس التفاعل مع الآخرين، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية.
- الاكتئاب والقلق: يمكن أن تؤدي التغيرات الجسدية والعاطفية الناتجة عن مرض العصب الوجهي إلى الاكتئاب والقلق.

تشخيص اعتلال العصب السابع:

يتم تشخيص مرض العصب الوجهي من قبل أخصائي رعاية صحية، وعادة ما يكون طبيب أعصاب أو أخصائي أنف وأذن وحنجرة، بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي والفحص البدني. يمكنهم أيضًا إجراء دراسات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية، لاستبعاد أي حالات أساسية يمكن أن تسبب الأعراض، مثل الأورام أو العدوى. في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لاختبارات إضافية مثل دراسة التوصيل العصبي أو تخطيط كهربية العضل (EMG) لتأكيد التشخيص.

الوقاية من اعتلال العصب السابع:

يمكن أن تكون الوقاية من مرض العصب الوجهي صعبة لأن السبب الأساسي غالبًا ما يكون غير معروف. ومع ذلك، تتضمن بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بأمراض العصب الوجهي ما يلي:

- السيطرة على الحالات الأساسية: إذا كان الشخص يعاني من حالة أساسية يُعرف عنها أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض العصب الوجهي ويجب علاجها بالشكل الصحيح





علاج اعتلال العصب السابع:

يعتمد علاج مرض العصب الوجهي على السبب الكامن وراء تلف الأعصاب ومدى تلفه.

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

- الأدوية: يمكن وصف الكورتيزون والأدوية المضادة للفيروسات لتقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأعصاب.
- العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تحسين توتر العضلات وحركة الوجه.
- الجراحة: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتخفيف الضغط على العصب الوجهي أو لإزالة الأورام التي تسبب تلف الأعصاب.
- قطرات أو مرهم للعين: لمنع جفاف وتهيج العين.
- حقن البوتكس: في بعض الحالات، يمكن استخدام حقن البوتكس لتحسين حركة العضلات وتناسقها.
- تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص قد لا يستجيبون للخط الأول من العلاجات وقد يحتاجون إلى علاجات أكثر تقدمًا مثل تخفيف ضغط العصب أو تطعيم الأعصاب.
- من المهم العمل عن كثب مع أخصائي الرعاية الصحية للعثور على خطة العلاج الأنسب، حيث قد تحتاج خيارات العلاج إلى تعديل بمرور الوقت اعتمادًا على استجابة المريض والآثار الجانبية للعلاج.

اعتماد: مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة